

УДК 598.97 (477.85)

**ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ СЕРОЙ НЕЯСЫТИ
(*STRIX ALUCO* L.; STRIGIFORMES, STRIGIDAE)
В ПРУТ-ДНЕСТРОВСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ УКРАИНЫ**

А.Н. Клитин¹, И.В. Скильский²

¹ Черновицкий национальный университет им. Ю.Федьковича
Украина, 58012, Черновцы, Коцюбинского, 2

² Черновицкий областной краеведческий музей
Украина, 58000, Черновцы, Кобылянской, 28

Поступила в редакцию 12.04.02 г.

Трофические связи серой неясыти (*Strix aluco* L.; Strigiformes, Strigidae) в Прут-Днестровском междуречье Украины. – Клитин А.Н., Скильский И.В. – Рассмотрены качественная и количественная структуры объектов питания серой неясыти на равнинной части Черновицкой области Украины.

Ключевые слова: серая неясыть, *Strix aluco*, трофическая связь, Прут-Днестровское междуречье, Украина.

Trophic relations of the Tawny Owl (*Strix aluco* L.; Strigiformes, Strigidae) in Prut-Dnestr interfluvium of Ukraine. – Klitin A.N., Skilsky I.V. – The qualitative and quantitative structure of objects of a feeding Tawny Owl in a flat part of Chernovtsy region of Ukraine is considered.

Key words: Tawny Owl, *Strix aluco*, trophic relation, Prut-Dnestr interfluvium, Ukraine.

По способу питания серая неясыть (*Strix aluco* Linnaeus, 1758) является узкоспециализированным видом птиц. В регионе Украинских Карпат она встречается повсеместно до верхней границы хвойных лесов (1500–1600 м н. у. м.) (Страутман, 1954, 1963; наши данные). На протяжении сезона размножения населяет как природные (в основном высокоствольные хвойные и смешанные леса, где предпочитает участки, граничащие с открытыми пространствами – большими полянами, вырубками, поймами рек), так и антропогенные (лесопарки, парки, сады) местообитания. В Прут-Днестровском междуречье – это гнездящийся, зимующий вид (Скильский, 2000).

Материалом для настоящего сообщения послужили сведения, собранные в середине – второй половине XX в. на территории равнинной части Черновицкой области. Изучено содержимое желудков 11 птиц (4 imm., 4 ad. самки и 4 ad. самца), добытых в различное время года в 6 пунктах региона (Цецинский лес на западной окраине г. Черновцы, окрестности с. Горбова, Рухотин, Стрелецкий Кут, Топоровцы и Черновка); они расположены по долинам р. Днестр и Прут, а также в районе Хотинской возвышенности. Полученные сведения обработаны по общепринятой методике.

Качественный состав пищи серой неясыти следующий (таблица). В желудках добытых птиц обнаружены остатки 20 особей животных, которые принадлежат к 5-ти видам из 4-х семейств, 3-х отрядов и 3-х классов. Явно преобладают мышевидные грызуны – 90 %, а в очень небольшом количестве представлены насекомые и птицы – по 5 %. Среди отдельных видов доминируют серая полевка (*Microtus arvalis* (Pall.)) и желтогорлая мышь (*Sylviaetus tauricus* (Pall.)).


Питание серой неясыти в Прут-Днестровском междуречье Украины

Компонент	Месяц – количество желудков							Всего
	IV–1	V–2	IX–1	XI–1	XII–2	I–2	II–2	
INSECTA								
Coleoptera								
Melolontha melolontha (L.)	1/1*	–	–	–	–	–	–	1/1
AVES								
Gen. sp.	–	1/1	–	–	–	–	–	1/1
MAMMALIA								
Rodentia								
Sylvaemus sylvaticus (L.)	–	–	1/1	–	–	–	–	1/1
S. tauricus (Pall.)	2/1	1/1	–	–	–	–	1/1	4/3
Microtus arvalis (Pall.)	–	–	–	2/1	2/2	5/2	4/1	13/6

*Число экземпляров/количество желудков.

Трофические связи серой неясыти имеют определенные сезонные отличия. Так, с середины весны и до начала осени для рациона характерна более разнообразная пища. В это время птицы охотятся не только на мелких млекопитающих, но и на небольших птиц и сравнительно крупных жуков. С конца осени и на протяжении всей зимы серая неясыть становится типичным миофагом: в указанный период времени употребляет в пищу исключительно мышевидных грызунов.

Вероятность поедания определенного вида корма рассчитывалась нами как отношение числа остатков соответствующего компонента пищи, обнаруженных в



Вероятность поедания серой неясытью соответствующих компонентов пищи в теплое (а) и холодное (б) время года в Прут-Днестровском междуречье Украины: 1 – Insecta, 2 – Aves, 3 – Mammalia

желудках, к общему количеству желудков последних. В этом плане получены следующие результаты (рисунок). С апреля по сентябрь рацион птиц более разнообразен, но вероятность употребления в пищу практически всех групп кормов достаточно низкая. На общем фоне наиболее выделяются мышевидные грызуны, значимость которых с приходом холодного времени года (ноябрь–февраль) резко возрастает.

Таким образом, трофические связи серой неясыти в Прут-Днестровском междуречье Украины имеют определенные сезонные различия. Рассмотренные

ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ СЕРОЙ НЕЯСЫТИ

нами материалы позволяют заключить, что это узкоспециализированный вид птиц. В их рационе наиболее важное место занимают мышевидные грызуны, составляя от 60.0 % весной до 100 % осенью и зимой. В небольшом количестве серая неясыть может употреблять в пищу сравнительно крупных насекомых (в первую очередь жуков), а также птиц (наверное, мелких и средних размеров). Последние, вероятно, занимают существенную долю рациона скорее всего в зимнее время, особенно в годы, когда грызуны бывают труднодоступны из-за большого обилия снега. Мы предполагаем, что в исключительных случаях птицы могут питаться и некоторыми видами рыб. Особенно это касается сопредельных с Прут-Днестровским междуречьем территорий – лесистых горных районов Украинских Карпат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Скільський І.В.* Структура й особливості формування фауни та населення птахів середнього міста (на прикладі Чернівців): Дис. ... канд. біол. наук. Київ, 2000. 307 с.
- Страутман Ф.И.* Птицы Советских Карпат. Киев: Изд-во АН УССР, 1954. 332 с.
- Страутман Ф.И.* Птицы западных областей УССР. Львов: Выща шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1963. Т. 1. 200 с.