

УДК 591.9(925.22): 599.323.4:576.89

**ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРЕБЕНЩИКОВОЙ ПЕСЧАНКИ –
MERIONES TAMARISCINUS (PALLAS, 1773)
В ВОСТОЧНОМ ПРИКАСПИИ**

О.В. Митропольский

*Центр профилактики карантинных и особо опасных инфекций
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан
Республика Узбекистан, 700169, Ташкент, Бобохон, 2
E-mail: olmit@list.ru*

Поступила в редакцию 25.06.08 г.

Особенности распространения гребенщиковой песчанки – *Meriones tamariscinus* (Pallas, 1773) в Восточном Прикаспии. – Митропольский О.В. – На основе собственных наблюдений автора проанализированы ранее опубликованные сведения о находках гребенщиковой песчанки на полуострове Мангышлак и плато Устюрт и дана карта Восточного Прикаспия с ареалами двух ее подвидов (*M. t. tamariscinus* и *M. t. jaxartensis*).

Ключевые слова: *Meriones tamariscinus*, подвиды, погадки хищных птиц, Восточный Прикаспий.

Distribution features of Tamarisk Jird – *Meriones tamariscinus* (Pallas, 1773) in the East Pre-Caspian region. – Mitropolsky O.V. – The previously published data on the locations of Tamarisk Jird on the Mangyshlak peninsula and the Ustyurt plateau have been analyzed and a map of the East Pre-Caspian region with the geographical ranges of two of its subspecies (*M. t. tamariscinus* and *M. t. jaxartensis*) is made on the basis of the author's observations.

Key words: *Meriones tamariscinus*, subspecies, pellets of predatory birds, East Pre-Caspian region.

Песчанки рода *Meriones* играют важную роль в поддержании циркуляции возбудителя в природных очагах чумы Палеарктики (Каримова, Неронов, 2007) и поэтому знание особенностей их распространения крайне важно для контроля эпизоотий среди них и обеспечения эпидемиологической безопасности населения, проживающего на очаговой территории. В данном кратком сообщении автор посчитал необходимым уточнить опубликованные в литературе данные о распространении гребенщиковой песчанки – *Meriones tamariscinus* (Pallas, 1773) в Восточном Прикаспии, где встречаются два ее подвида.

Распространение номинативного подвида (*Meriones tamariscinus tamariscinus*) на Устюрте ограничивается только северной частью этого плато. Появившиеся в последние годы в литературе сведения и карты распространения гребенщиковой песчанки на рассматриваемой территории в значительной своей части не корректны. Прежде всего это касается распространения гребенщико-вых песчанок на п-ове Мангышлак.

По материалам экспедиции 1937 г. на основе изучения погадок хищных птиц указывается (Фенюк, Камнев, 1957) обитание гребенщиковой песчанки в центральной части п-ова Мангышлака (урочище Уланак). Почти одновременно, по ма-


териалам 1936 г., ее здесь, якобы, добыл С.Г. Гребельский (1939). Однако приводимые диагностические признаки пойманного им экземпляра указывают на его явную принадлежность к краснохвостой песчанке (*Meriones lybicus* Lichtenstein, 1823). В последующем эти сведения о местонахождениях гребенщиковой песчанки на п-ове Мангышлак породили значительную путаницу в других публикациях. В частности, В.В. Кучерук (1993) при описании особенностей ареала гребенщиковой песчанки прямо указывает на ее обитание в Уланакской долине, несмотря на то, что данный вопрос мы подробно с ним обсуждали и он согласился с ошибкой в определении вида у С.Г. Гребельского. Характерно, что П.А. Пантелеев (Пантелеев и др., 1990), с которым мы также обсуждали детали распространения гребенщико-вых песчанок в Восточном Прикаспии, правильно исключил п-ов Мангышлак из ареала гребенщиковой песчанки, за что получил упрек от В.В. Кучерука (1993). Таким образом, единственное указание на нахождение гребенщиковой песчанки на п-ове Мангышлак, основанное на анализе погадок хищных птиц, принадлежит Б.К. Фенюку и П.И. Камневу (1957). Но при этом надо учесть, что в 30-е годы определение остеологических остатков из погадок, особенно в совместных поселениях нескольких видов рода *Meriones*, было не всегда достоверным. В частности, это допускал и П.И. Камнев, один из авторов упомянутой выше статьи, с которым мы несколько лет совместно работали на п-ове Мангышлак, в том числе и в Уланакской долине. Можно добавить, что обширные и тщательные обследования зоологов противочумной системы в этом районе, начиная с 1946 г. по настоящее время (а в 1962 – 1967 гг. с участием автора этих строк), однозначно показывают отсутствие гребенщиковой песчанки в пределах п-ова Мангышлак. Добавим, что включение в ареал данного вида п-ова Бузачи (Кучерук, 1993) вообще не имело никаких оснований – этого вида там нет.

А.Ф. Ковшарь (1990) в обзоре фауны млекопитающих Устьюртского заповедника, расположенного в юго-западной части плато Устьюрт, среди многих фантастических для этой территории «общеустюртских» видов привел и гребенщико-вую песчанку, которая, безусловно, здесь не встречается.

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что изображение на картах сплошного ареала гребенщиковой песчанки в восточной части плато Устьюрт (Кучерук, 1993; Пантелеев и др., 1990) не соответствует действительности. Между встречающейся на северном Устьюрте номинативной формой (*M. t. tamariscinus*) и подвидом гребенщиковой песчанки (*M. t. jaxartensis*), распространенным в долине Амударьи, существует пространственный разрыв в сотни километров (рисунок). Кстати, ареал *M. t. jaxartensis*, правильно показанный на карте В.В. Кучерука (1993), совершенно ошибочно изображен в работе П.А. Пантелеева с соавторами (1990), где он ограничен только низовьями Амударьи. Надо сказать, что гребенщико-вая песчанка, будучи широко распространенной в долинной и оазисной частях Каракалпакстана и северо-восточного Туркменистана, непосредственно на плато Устьюрт не заходит. Здесь имеется единственная находка (см. рисунок, 3).

В мае 1985 г. при первом, и до настоящего времени единственном, эпизоотологическом обследовании труднодоступной впадины Ассак-аудан, расположен-

ной на крайнем юге Каракалпакского Устюрта, был добыт экземпляр гребенщиковой песчанки (Мартиневский и др., 1987). Сомневаться в правильности определения вида в этом случае не приходится, так как зоологи Каракалпакской противочумной станции проводили многолет-



Распространение гребенщиковой песчанки (*Meriones tamariscinus*) в Восточном Прикаспии: 1 – ареал *M. t. tamariscinus*, 2 – ареал *M. t. jaxartensis*, 3 – изолированное нахождение *M. t. jaxartensis* во впадине Ассаке-аудан, ошибочные указания на нахождение на юго-западном Устюрте (4) и на п-ове Мангышлак в Уланакской долине (5)

по-видимому, стало возможным в результате новейшего расселения вида по новым оросительным системам (Марочкина, 2005) или же они принадлежат к реликтовым изолятам, сохранившимся в системе впадин Сарыкамыш и Ассаке-аудан со времен, когда в них впадала пра-Амударья и когда отсюда вытекал Узбой.

Надеюсь, что приведенные детали распространения гребенщиковой песчанки в Восточном Прикаспии будут полезны для анализа хорологии и филогеографии песчанок в аридных регионах Евразии, проводимого в настоящее время при финансовой поддержке РФФИ/ГФЕН (проект № 05-04-39018).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гребельский С.Г. Фаунистические и экологические наблюдения в стациях пустынь полуострова Мангышлак по материалам экспедиции 1936 г. // Тр. Военно-мед. акад. РККА им. С.М. Кирова. 1939. Т. 18. С. 199 – 227.

Каримова Т.Ю., Неронов В.М. Природные очаги чумы Палеарктики. М.: Наука, 2007. 198 с.

Ковшарь А.Ф. Устюртский заповедник // Заповедники СССР: Заповедники Средней Азии и Казахстана. М.: Мысль, 1990. С. 30 – 41.

Кучерук В.В. История и современное состояние изученности распространения песчанок рода *Meriones* // Песчанки рода *Meriones* России и сопредельных территорий: библиография и ареалогия. Ч. 3. Указатели и описание ареалов. М.: Экопрос, 1993. С. 101 – 136.

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРЕБЕНЩИКОВОЙ ПЕСЧАНКИ

Марочкина В.В. Тамарисковая песчанка (*Meriones tamariscinus* Pallas, 1773) // Зайцеобразные и грызуны пустынь Средней Азии. М.: ГЕОС, 2005. С. 201 – 205.

Мартиневский И.Л., Кенжебаев А.Я., Асенов Г.А. Устьюртский очаг чумы (эпизоотологические аспекты и лейцинозависимость возбудителя). Нукус: Каракалпакстан, 1987. 154 с.

Пантелеев П.А., Терехина А.Н., Варшавский А.А. Экогеографическая изменчивость грызунов. М.: Наука, 1990. 373 с.

Реймов Р. Фауна млекопитающих Заунгузского Каракума и окрестностей Сарыкамышского озера, ее численность и размещение // Вестн. Каракалпак. фил. АН УзССР. 1985. № 2. С. 30 – 38.

Фенюк Б.К., Камнев П.И. Заметки о фауне млекопитающих Мангышлака и Устьюрта // Грызуны и борьба с ними. Саратов: Кн. изд-во, 1957. Вып. 5. С. 387 – 397.