


РЕЦЕНЗИИ

Рецензия на книгу V. V. Anikin, S. A. Sachkov, V. V. Zolotuhin
“Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis”: from P. Pallas to Present Days”.
Proceedings of the museum Witt Munich. 2017. Vol. 7. 696 p.

В трудах Мюнхенского энтомологического музея Витта на английском языке вышла коллективная монография по фауне чешуекрылых Волго-Уральского региона профессоров энтомологов поволжских университетов – В. В. Аникина, С. А. Сачкова и В.В. Золотухина.

Монография представляет собой итог 25-летних изысканий авторов по изучению фауны чешуекрылых региона. В административном отношении она охватывает по России Калмыкию (данные по ней приводятся впервые), Астраханскую, Волгоградскую, Саратовскую, Самарскую, Ульяновскую, Оренбургскую области и Республику Башкортостан, а также Уральскую и Атыраускую (Гурьевскую) области Северо-Западного Казахстана. Исходно предварительные результаты исследований были опубликованы в немецком журнале «Atalanta» (1993 – 2009) в виде цикла статей и ставили своей целью отразить современное состояние отряда в сравнении с данными известной работы крупнейшего энтомолога Поволжья, казанского почетного профессора Александра Эдуарда Фридриха фон Эверсмана (1844). По сути, на момент начала авторских исследований для Поволжья не было известно ни одной работы, которая по широте охвата региона и по количеству рассмотренных видов была бы сравнима с его монографией.

Представленные данные основаны на результатах обработки сборов из многочисленных экспедиций авторов по данному региону, работы в ведущих музеях России и европейских стран (Англии, Германии, Австрии, Польши, Румынии, Венгрии, Швеции, Дании, Франции, Украины) с коллекционными материалами известных энтомологов XIX – XX столетий, работавших на этой территории, и на достоверных литературных данных. В книге дан исторический обзор по исследованиям фауны чешуекрылых, начиная от П. Палласа до настоящего времени, и проанализировано более 300 источников, включая и первоописания видов. Отдельно рассмотрены природные зональные комплексы от южной тайги до песчаных пустынь Прикаспия, приведены результаты инвентаризации фауны. Для каждого семейства отмечается нахождение вида на территории, указаны синонимы ви-



дов, кормовые растения, на которых развиваются гусеницы, и указывается типовая местность при описании вида в регионе.

В настоящее время состав лепидоптерофауны Волго-Уральского региона насчитывает 4101 вид из 82 семейств, что составляет более 1/3 фауны всего отряда на территории России. Авторами добавлено 2208 видов к списку Эверсмана, но 67 видов исключено из региональной фауны. Эти виды были или неправильно определены ранее, или уже исчезли из региона, или были включены случайно (например, *Mirina christophi* (Staudinger, 1887) и *Euchampsonia cristata* (Butler, 1877)). 715 видов отмечается для Калмыкии, 1072 – для Астраханской области, 1718 – Волгоградской, 2366 – Саратовской, 1954 – Самарской, 2034 – Ульяновской, 1554 – для Башкирии, 1501 – для Уральской и Атырауской областей Казахстана и 1900 – для Оренбургской области.

В книге описаны два новых для науки вида. Это пяденица *Ourapteryx niveiscythes* для Астраханской области и моль-чехлоноска *Augasma uljanovi* для Ульяновской и Саратовской областей. Большая часть типовых экземпляров, описанных из региона почти за 200-летний период (это около 400 видов), были отсняты авторами и представлены в книге на 64 цветных таблицах.

В Приложении приводятся отдельные статьи ведущих лепидоптерологов России и Европы по вопросам систематики групп чешуекрылых данного региона, а также информация по видам различных семейств из региона, представленных в коллекциях европейских музеев.

Безусловно, книга представляет научный интерес для специалистов-экологов, аспирантов, учителей, студентов-биологов, владеющих английским языком.

О. Г. Горбунов

Институт проблем экологии и эволюции
им. А. Н. Северцова РАН
117071, Москва, Ленинский просп., 33
E-mail: gorbunov.oleg@mail.ru