

РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПТИЦЫ НА СТРАНИЦАХ КРАСНОЙ КНИГИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Е.В. Завьялов¹, Г.В. Шляхтин¹, В.Г. Табачишин², Н.Н. Якушев¹,
А.В. Хрустов², В.В. Пискунов¹, А.В. Беляченко¹

¹ *Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
Россия, 410012, Саратов, Астраханская, 83*

² *Саратовский филиал Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
Россия, 410028, Саратов, Рабочая, 24*

Поступила в редакцию 12.09.05 г.

Редкие и исчезающие птицы на страницах Красной книги Саратовской области. – Завьялов Е.В., Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Якушев Н.Н., Хрустов А.В., Пискунов В.В., Беляченко А.В. – На основе обширных полевых исследований, коллекционных сведений, анализа данных литературы и других источников составлен перечень видов и подвидов птиц, рекомендуемых к включению во второе издание Красной книги Саратовской области. Он содержит 73 представителя орнитофауны региона, относящихся к 14 отрядам, 30 семействам и 59 родам. Рекомендуемые птицы классифицированы на основе изучения количественных показателей и популяционных трендов в шесть категорий, для каждой из которых определен природоохранный статус. Предлагается включение во второе издание региональной Красной книги 28 новых и исключение 4 видов, возникли предпосылки для пересмотра прежнего охрannого статуса 15 таксонов. В особый обширный перечень (37 видов) включены таксоны и популяции птиц, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде на территории Саратовской области.

Ключевые слова: орнитофауна, классификация, природоохранный статус, Саратовская область.

Rare and disappearing birds in the Red Book of Saratov region. – Zavialov E.V., Shlyakhtin G.V., Tabachishin V.G., Yakushev N.N., Khrustov A.V., Piskunov V.V., Belyachenko A.V. – A list of bird species and subspecies to be included into the second edition of the Red Book of the Saratov region has been compiled on the basis of numerous field surveys, collection data, analysis of the literature and other sources. It contains 73 ornithofauna representatives of the region belonging to 14 orders, 30 families, and 59 genera. On the basis of quantitative indicators and population trends the candidate birds are categorized in six categories, for each of which the nature protection status has been determined. 28 new species should be included into the second edition of the regional Red Book and 4 species should be excluded, some reasons have appeared for revision of the current protection status of 15 taxa. A special large list (37 species) contains taxa and populations of birds standing in need of special attention to their status in the environment of the Saratov region.

Key words: ornithofauna, classification, nature protection status, Saratov region.

Разнообразие природно-климатических условий Саратовской области обуславливает значительное видовое богатство фауны. Ежегодно список животных, встречающихся на территории региона, пополняется вновь зарегистрированными видами. Однако усиление как прямого, так и косвенного антропогенного воздействия на экосистемы приводит к деградации большого числа видов, угнетению популяций, нарушению пространственно-временной структуры их ареалов. В этой си-

туации охрана уязвимых животных становится наиболее актуальной задачей, а определение научно-организационных и юридических основ природоохранных мероприятий – первоочередной проблемой, к решению которой подключены специалисты различных отраслей биологии и экологии (Шляхтин, Завьялов, 1997). Одним из путей решения данной проблемы является подготовка и издание Красных книг различного уровня. Региональные издания призваны при этом выполнять две основные задачи. Во-первых, с их помощью осуществляется мониторинг состояния угрожаемых представителей флоры и фауны и видов, демонстрирующих снижение численности. Во-вторых, обосновываются и организуются эффективные меры охраны популяционных и субпопуляционных группировок исчезающих видов (Флинт, 2004).

С момента выхода первого издания Красной книги Саратовской области (1996) прошло уже более девяти лет. Отечественный и зарубежный опыт наглядно показывает, что наиболее эффективна система, когда региональные Красные книги переиздаются каждые десять лет (Флинт, Присяжнюк, 1991). За указанный период состояние популяций многих видов птиц региона изменилось, что требует пересмотра их охранного статуса и оценки эффективности рекомендованных в прошлом природоохранных мер. Целесообразность таких изменений обусловлена несколькими причинами. Среди них на первый план выходит межведомственная несогласованность, когда вся фауна делилась на «промысловую», «непромысловую» и «краснокнижную» и каждая из этих искусственных группировок «курировалась» определенным ведомством (Управлением охотничьего хозяйства, Комитетом по охране окружающей среды, Комитетом по охране природных ресурсов и т.д.). Именно по этой причине на страницы Красной книги не попали виды, рассматриваемые в прошлом традиционно как охотничье-промысловые (серый гусь – *Anser anser*, пискун – *A. erythropus*), популяции которых в пределах Саратовской области требуют охраны. Вторая по важности причина более тривиальна. Она определяется ограниченностью объема самой книги, не сумевшей вместить всех «кандидатов», отобранных на основе обстоятельных научных консультаций, из-за нехватки финансовых средств на ее издание. Таким образом, в настоящее время возникла объективная необходимость обоснования списка редких и исчезающих птиц Саратовской области, рекомендуемых к включению во второе издание региональной Красной книги.

Значимым подспорьем в реализации поставленной цели явилось издание Красной книги Российской Федерации (2001). Она призвана проиллюстрировать перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ по состоянию на 01.11.1997 г. (приложение 1 к приказу Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 г. № 569, изменения в приказе Госкомэкологии РФ от 05.11.1999 г. № 659). Кроме того, в книге представлен список объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании (приложение 2 к приказу Госкомэкологии РФ от 12.05.1998 г. № 290, изменения в приказе от 11.02.2000 г. № 71). В ходе ее подготовки широкая научная общественность была привлечена к обсуждению перечня редких и исчезающих птиц. Например, активное участие саратовских ученых в дискуссии об изменении списков объектов животного мира, подлежащих охране, способствовало включению в Красную книгу Российской Федерации номинативного подвиды среднего дятла (*Dendrocopos medius medius*) (Завьялов, Табачишин, 2000).

Комплекс осуществленных на сегодняшний день работ позволил составить перечень таксонов и популяций птиц, рекомендуемых к внесению во второе издание региональной Красной книги, переиздание которой планируется осуществить в 2006 г. В него включены 73 вида птиц фауны Саратовской области, относящихся к 14 отрядам, 30 семействам и 59 родам (табл. 1). В отношении статуса наиболее значима группа птиц, охраняемых на государственном уровне (Красная книга..., 2001), встречи которых в пределах изучаемой территории носят редкий нерегулярный характер (6-я категория). Меньше всего видов относится к группе птиц с восстановленной численностью, что в общем свидетельствует о неблагоприятном состоянии окружающей среды в регионе, когда объективно отсутствуют условия для стабилизации состояния популяций редких и исчезающих представителей орнитофауны.

Таблица 1

Количественная характеристика таксонов птиц, рекомендуемых к включению во второе издание Красной книги Саратовской области

№ п/п	Отряд	Количество видов						
		Категория редкости						Всего
		1	2	3	4	5	6	
1	Гагарообразные – Gaviiformes	–	–	–	–	–	1	1
2	Поганкообразные – Podicipediformes	–	–	1	–	–	–	1
3	Веслоногие – Pelecaniformes	–	–	–	–	–	2	2
4	Аистообразные – Ciconiiformes	1	–	–	–	1	3	5
5	Фламингообразные – Phoenicopteriformes	–	–	–	–	–	1	1
6	Гусеобразные – Anseriformes	1	–	2	–	–	6	9
7	Соколообразные – Falconiformes	8	3	3	–	–	7	21
8	Куриобразные – Galliformes	–	–	1	–	–	–	1
9	Журавлеобразные – Gruiformes	–	1	1	1	2	1	6
10	Ржанкообразные – Charadriiformes	1	5	4	1	–	3	14
11	Голубеобразные – Columbiformes	–	–	–	1	–	–	1
12	Совообразные – Strigiformes	–	1	–	–	–	–	1
13	Дятлообразные – Piciformes	–	1	1	–	–	–	2
14	Воробьинообразные – Passeriformes	1	1	2	3	–	1	8

Примечание. Статус видов указывается на основе рекомендаций Г.В. Шляхтина и др., 2006 (см. статью в данном номере, с. 5 – 17).

Во второе издание Красной книги Саратовской области целесообразно включить 28 новых видов (табл. 2). Большая часть из них (европейская чернозобая гагара – *Gavia arctica arctica*, розовый пеликан – *Pelecanus onocrotalus*, кудрявый пеликан – *P. crispus*, египетская цапля – *Bubulcus ibis*, каравайка – *Plegadis falcinellus*, обыкновенный фламинго – *Phoenicopterus roseus*, черная казарка – *Branta bernicla*, пискулька – *Anser erythropus*, малый лебедь – *Cygnus bewickii*, мраморный чирок – *Anas angustirostris*, малый подорлик – *Aquila pomarina*, орлан-долгохвост – *Haliaeetus leucoryphus*, стервятник – *Neophron percnopterus*, черный гриф – *Aegypius monachus*, белоголовый сип – *Gyps fulvus*, кречет – *Falco rusticolus*, сапсан – *Falco peregrinus*, степхь – *Grus leucogeranus*, шилоклювка – *Recurvirostra avosetta*, чеграва – *Hydroprogne caspia*, серый сорокопут – *Lanius excubitor*) отнесены к 6-й категории. Это обусловлено нормативным положением, согласно которому все

РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПТИЦЫ

животные, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, подлежат занесению в Красные книги республик, краев, областей и автономных образований в составе Российской Федерации (Красная книга..., 2001).

Таблица 2

Таксономическая и природоохранная характеристика таксонов птиц, рекомендуемых к внесению во второе издание Красной книги Саратовской области

№ п/п	Вид / подвид	Рекомендуемый статус	Примечание
1	2	3	4
КЛАСС ПТИЦЫ – AVES			
Отряд Гагарообразные – Gaviiformes			
Семейство Гагаровые – Gaviidae			
1	Европейская чернозобая гагара – <i>Gavia arctica arctica</i> (Linnaeus, 1758)	6	Красная книга РФ, вносится вновь
Отряд Поганкообразные – Podicipediformes			
Семейство Поганковые – Podicipedidae			
2	Серощекая поганка – <i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	3	Без изменений
Отряд Веслоногие – Pelecaniformes			
Семейство Пеликановые – Pelecanidae			
3	Розовый пеликан – <i>Pelecanus onocrotalus</i> Linnaeus, 1758	6	Красная книга РФ, вносится вновь
4	Кудрявый пеликан – <i>Pelecanus crispus</i> Bruch, 1832	То же	То же
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes			
Семейство Цаплевые – Ardeidae			
5	Египетская цапля – <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	»	»
6	Большая белая цапля – <i>Egretta alba</i> (Linnaeus, 1758)	5	Изменение категории, была 3
7	Колпица – <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	6	Изменение категории, была 4
8	Каравайка – <i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	То же	Красная книга РФ, вносится вновь
Семейство Аистовые – Ciconiidae			
9	Черный аист – <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	1	Без изменений
Отряд Фламингообразные – Phoenicopteriformes			
Семейство Фламинговые – Phoenicopteridae			
10	Обыкновенный фламинго – <i>Phoenicopterus roseus</i> Pallas, 1811	6	Красная книга РФ, вносится вновь
Отряд Гусеобразные – Anseriformes			
Семейство Утиные – Anatidae			
11	Черная казарка – <i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	То же	То же
12	Краснозобая казарка – <i>Rufibrenta ruficollis</i> (Pallas, 1769)	»	Без изменений
13	Пискулька – <i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	»	Красная книга РФ, вносится вновь
14	Малый лебедь – <i>Cygnus bewickii</i> Yartrell, 1830	»	То же
15	Огарь – <i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764)	3	Изменение категории, была 2
16	Пеганка – <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	То же	Изменение категории, была 5
17	Мраморный чирок – <i>Anas angustirostris</i> Menetries, 1832	6	Красная книга РФ, вносится вновь

Продолжение табл. 2

1	2	3	4
18	Белоглазая чернеть – <i>Aythya nyroca</i> (Guldenstadt, 1770)	1	То же
19	Савка – <i>Oxyura leucocephala</i> (Scopoli, 1769)	6	Без изменений
Отряд Соколообразные – Falconiformes			
Семейство Скопиные – Pandionidae			
20	Скопа – <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	1	То же
Семейство Ястребиные – Accipitridae			
21	Обыкновенный осоед – <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	3	»
22	Степной лунь – <i>Circus macrourus</i> (S.G.Gmelin, 1771)	1	Изменение категории, была 2
23	Европейский тювик – <i>Accipiter brevipes</i> (Severtzov, 1850)	2	Изменение категории, была 3
24	Курганник – <i>Buteo rufinus</i> (Cretzschmar, 1827)	То же	Без изменений
25	Змееяд – <i>Circus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	1	То же
26	Орел-карлик – <i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	3	»
27	Степной орел – <i>Aquila rapax</i> (Temminck, 1828)	1	Изменение категории, была 2
28	Большой подорлик – <i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811	2	Изменение категории, была 3
29	Малый подорлик – <i>Aquila pomarina</i> C.L. Brehm, 1831	6	Красная книга РФ, вносится вновь
30	Могильник – <i>Aquila heliaca</i> Savigny, 1809	1	Без изменений
31	Беркут – <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	То же	То же
32	Орлан-долгохвост – <i>Haliaeetus leucoryphus</i> (Pallas, 1771)	6	Красная книга РФ, вносится вновь
33	Орлан-белохвост – <i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	3	Без изменений
34	Стервятник – <i>Neophron percnopterus</i> (Linnaeus, 1758)	6	Красная книга РФ, вносится вновь
35	Черный гриф – <i>Aegypius monachus</i> (Linnaeus, 1766)	То же	То же
36	Белоголовый сип – <i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	»	»
Семейство Соколиные – Falconidae			
37	Кречет – <i>Falco rusticolus</i> Linnaeus, 1758	»	»
38	Балобан – <i>Falco cherrug</i> Gray, 1834	1	Без изменений
39	Сапсан – <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	6	Красная книга РФ, вносится вновь
40	Степная пустельга – <i>Falco naumanni</i> Fleischer, 1818	1	Без изменений
Отряд курообразные – Galliformes			
Семейство Тетеревиные – Tetraonidae			
41	Тетерев – <i>Lyrurus tetrix</i> (Linnaeus, 1758)	3	Изменение категории, была 5
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes			
Семейство Журавлиные – Gruidae			
42	Стерх – <i>Grus leucogeranus</i> Pallas, 1773	6	Красная книга РФ, вносится вновь
43	Серый журавль – <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	3	Без изменений
44	Красавка – <i>Anthropoides virgo</i> (Linnaeus, 1758)	5	То же
Семейство Пастушковые – Rallidae			
45	Погоныш-крошка – <i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)	4	»
Семейство Дрофиные – Otididae			
46	Дрофа (европейский подвид) – <i>Otis tarda tarda</i> Linnaeus, 1758	5	»
47	Стрепет – <i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	2	»

РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПТИЦЫ

Продолжение табл. 2

1	2	3	4
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes			
Семейство Авдотковые – Burhinidae			
48	Авдотка – <i>Burhinus oedicephalus</i> (Linnaeus, 1758)	2	»
Семейство Ржанковые – Charadriidae			
49	Каспийский зуек – <i>Charadrius asiaticus</i> Pallas, 1773	4	Красная книга РФ, вносится вновь
50	Кречетка – <i>Chettusia gregaria</i> (Pallas, 1771)	1	Без изменений
Семейство Шилогловковые – Recurvirostridae			
51	Ходулочник – <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	3	То же
52	Шилогловка – <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	6	Красная книга РФ, вносится вновь
Семейство – Кулики-сороки – Haematopodidae			
53	Кулик-сорока – <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	3	То же
Семейство Бекасовые – Scolopacidae			
54	Поручейник – <i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	То же	Без изменений
55	Дупель – <i>Gallinago media</i> (Latham, 1787)	2	То же
56	Большой кроншнеп – <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	То же	»
57	Большой веретенник – <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	3	Изменение категории, была 2
Семейство Тиркушковые – Glareolidae			
58	Степная тиркушка – <i>Glareola nordmanni</i> Nordmann, 1842	2	Без изменений
Семейство Чайковые – Laridae			
59	Черноголовый хохотун – <i>Larus ichthyaetus</i> Pallas, 1773	6	То же
60	Чеграва – <i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770)	То же	Красная книга РФ, вносится вновь
61	Малая крачка – <i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764	2	То же
Отряд Голубеобразные – Columbiformes			
Семейство Голубиные – Columbidae			
62	Клентух – <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	4	Вносится вновь
Отряд Сивообразные – Strigiformes			
Семейство Сивинные – Strigidae			
63	Филин – <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	2	Без изменений
Отряд Дятлообразные – Piciformes			
Семейство Дятловые – Picidae			
64	Зеленый дятел – <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	То же	Изменение категории, была 3
65	Средний дятел (европейский подвид) – <i>Dendrocopos medius medius</i> (Linnaeus, 1758)	3	Изменение категории, была 4
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes			
Семейство Ласточковые – Hirundinidae			
66	Воронка – <i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758)	2	Вносится вновь
Семейство Жаворонковые – Alaudidae			
67	Степной жаворонка – <i>Melanocorypha calandra</i> (Linnaeus, 1766)	3	Изменение категории, была 2
68	Белокрылый жаворонка – <i>Melanocorypha leucoptera</i> (Pallas, 1811)	То же	То же
69	Черный жаворонка – <i>Melanocorypha yeltoniensis</i> (J.R.Forster, 1768)	1	»
Семейство Сорокопудовые – Laniidae			
70	Серый сорокопуд – <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	6	Красная книга РФ, вносится вновь

Окончание табл. 2

1	2	3	4
Семейство Славковые – Sylviidae			
71	Вертялая камышевка – <i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817)	4	То же
Семейство Мухоловковые – Muscicapidae			
72	Черноголовый чекан – <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	То же	Без изменений
Семейство Синицевые – Paridae			
73	Белая лазоревка – <i>Parus cyanus</i> Pallas, 1770	»	То же

Из видов птиц, охраняемых на государственном уровне, в составе гнездовой фауны региона отмечено 5 видов (белоглазая чернеть, каспийский зуек, кулик-сорока, малая крачка, вертялая камышевка). Все они рекомендуются к внесению во второе издание Красной книги Саратовской области с различными категориями охраны. Клинтух и воронок относятся к группе видов, чье распространение и численность на изучаемой территории резко сократились. Современное состояние популяций данных птиц требует скорейшей разработки и внедрения мер по их охране, что возможно реализовать только при придании им «краснокнижного» статуса.

Кроме того, объективно возникли предпосылки для пересмотра прежнего охранного статуса 15 видов. В составе данной группы целесообразно выделить две подгруппы. К первой из них относятся птицы, динамика распространения и численности которых имеет положительный характер. В их числе большая белая цапля, огарь, большой веретенник, степной и белокрылый жаворонки, категория степени редкости которых понижается (табл. 3). Ко второй подгруппе следует отнести птиц (колпицу, пеганку, степного луня, европейского тювика, степного орла, большого подорлика, тетерева, зеленого и среднего дятлов, черного жаворонка), состояние популяций которых за последнее десятилетие ухудшилось. Причины данного явления многоплановы, они обусловлены взаимным влиянием антропогенных и абиотических факторов.

Таблица 3

Характеристика таксонов птиц, рекомендуемых к изменению статуса во втором издании Красной книги Саратовской области

№ п/п	Вид	Современный статус	Рекомендуемый статус	Основание для изменения статуса
1	2	3	4	5
1	Большая белая цапля – <i>Egretta alba</i> (Linnaeus, 1758)	3	5	Повсеместное расширение ареала
2	Колпица – <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	4	6	Гнездование вероятно
3	Огарь – <i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764)	2	3	Повсеместное расширение ареала
4	Пеганка – <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	5	То же	Повсеместное сокращение численности
5	Степной лунь – <i>Circus macrourus</i> (S.G. Gmelin, 1771)	2	1	Красная книга РФ, 2001
6	Европейский тювик – <i>Accipiter brevipes</i> (Severtzov, 1850)	3	2	То же
7	Степной орел – <i>Aquila rapax</i> (Temminck, 1828)	2	1	»

РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПТИЦЫ

Окончание табл. 3

1	2	3	4	5
8	Большой подорлик – <i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811	3	2	»
9	Тетерев – <i>Lyrurus tetrix</i> (Linnaeus, 1758)	5	3	Повсеместное сокращение численности
10	Большой веретенник – <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	2	То же	Некоторое расширение ареала
11	Зеленый дятел – <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	3	2	Повсеместное сокращение численности
12	Средний дятел – <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	4	3	Красная книга РФ, 2001
13	Степной жаворонок – <i>Melanocorypha calandra</i> (Linnaeus, 1766)	2	То же	Некоторое расширение ареала
14	Белокрылый жаворонок – <i>Melanocorypha leucoptera</i> (Pallas, 1811)	То же	»	То же
15	Черный жаворонок – <i>Melanocorypha yeltoniensis</i> (J.R. Forster, 1768)	»	1	Повсеместное сокращение численности

Составлен и приводится ниже аннотированный перечень видов птиц, предлагаемых к исключению из Красной книги Саратовской области. В данный список вошли таксоны и популяции, данные о восстановлении численности и (или) ареала которых, а также о положительных изменениях условий их существования или другие данные свидетельствуют об отсутствии необходимости принятия срочных мер по их охране и воспроизводству.

Аннотированный перечень видов птиц, предлагаемых к исключению из Красной книги Саратовской области (проект приложения 1 к Красной книге Саратовской области)

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

1. Лебедь-шипун – *Syrnoides olus* (Gmelin, 1789). Численность достигла относительно высоких значений, гнездовой ареал включает всю территорию Саратовской области.

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

2. Пастушок – *Rallus aquaticus* Linnaeus, 1758. Современные данные свидетельствуют об относительно стабильном состоянии популяций и широком распространении.

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

3. Обыкновенный сверчок – *Locustella naevia* (Boddaert, 1783). Состояние популяций не демонстрирует отрицательных тенденций, распространение широкое, но мозаичное.

4. Черноголовая гаичка – *Parus palustris* Linnaeus, 1758. Вид в регионе обитает на границе репродуктивного ареала, состояние окраинных популяций стабильное.

Составлен также и представляется для обсуждения научной общественностью аннотированный перечень видов, рекомендуемых к выведению из фаунистических списков Саратовской области. Это птицы, встречи которых на изучаемой территории имеют крайне редкий случайный характер.

*Аннотированный перечень видов птиц,
рекомендуемых к выведению из фаунистических списков Саратовской области
(проект приложения 2 к Красной книге Саратовской области)*

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

1. Мандаринка – *Aix galericulata* (Linnaeus, 1758). В фаунистические списки области была внесена на основе сообщения В.Н. Мосейкина (2000). Ссылаясь на данные охотоведа Дергачевского административного района В. Никитина, исследователь указывает, что взрослый селезень мандаринки был добыт охотниками на упомянутой территории в начале апреля 1990 г. Научно-коллекционная тушка данной особи не была сохранена.

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

2. Султанка – *Porphyrio porphyrio* (Linnaeus, 1758). Известен единственный факт случайной добычи охотниками взрослой султанки в конце августа 1998 г. на волжских островах на территории Ровенского административного района. В данном случае в Управление охотничьего хозяйства по Саратовской области было доставлено лишь крыло султанки, которое впоследствии не было сохранено (Мосейкин, 2000).

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

3. Тонкоклювый кроншнеп – *Numenius tenuirostris* Vieillot, 1817. В фаунистические списки внесен на основе сообщения Р.А. Девишева (1975) о залете птицы на р. Большой Узень в период с 1962 по 1966 гг. В 1989 г. появилось указание В.Н. Мосейкина (1992) на вероятное пребывание этих птиц на юго-востоке Заволжья. В последующие годы, несмотря на специальные и тщательные поиски, куликов в данных районах и на сопредельных территориях обнаружить не удалось. Предположение об обитании вида на севере Нижнего Поволжья не подтвердилось (Морозов, 1998).

4. Реликтовая чайка – *Larus relictus* Lönnerberg, 1931. Известно лишь одно сообщение о регистрации в долине р. Малый Узень вблизи хут. Дрямский 07.05.2000 г. 14 реликтовых чаек (Пискунов и др., 2001). Видео-, фотоматериалов или иных достоверных данных, подтверждающих правильность определения чаек в природе, не существует.

В особый обширный перечень включены таксоны и популяции птиц, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде на территории Саратовской области. К ним отнесено 37 видов. В данный перечень вошли таксоны и популяции, сведения о численности и состоянии ареала которых, а также условиях их существования свидетельствуют, что в настоящее время еще отсутствует необходимость принятия срочных мер по их охране и воспроизводству на региональном уровне, т.е. включения в Красную книгу Саратовской области. Перечень содержит также виды, включенные в Красную книгу МСОП, приложения СИТЕС, COUNCIL REGULATION, приложения Бернской конвенции и другие международные законодательные акты и соглашения, срочные меры по охране и воспроизводству которых на территории Саратовской области не требуются.

РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПТИЦЫ

*Аннотированный перечень видов птиц,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде
(проект приложения 3 к Красной книге Саратовской области)*

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

1. Рыжая цапля – *Ardea purpurea* Linnaeus, 1766. Современные данные указывают на нестабильный характер гнездования вида на севере Нижнего Поволжья. Амплитуда динамики количественных показателей значительна, что требует внесения в перечень особого внимания.

2. Белый аист – *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758). Внесен в приложение 2 к приказу Госкомэкологии РФ № 290 от 12.05.1998 г. как вид, нуждающийся в особом внимании.

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

3. Серый гусь – *Anser anser* (Linnaeus, 1758). Внесен в приложение 2 к приказу Госкомэкологии РФ № 290 от 12.05.1998 г. как вид, нуждающийся в особом внимании.

4. Белый гусь – *Chen caerulescens* (Linnaeus, 1758). Внесен в приложение 2 к приказу Госкомэкологии РФ № 290 от 12.05.1998 г. как вид, нуждающийся в особом внимании.

5. Лебедь-шипун – *Cygnus olor* (Gmelin, 1789). Выводится из списков региональной Красной книги на основе современных данных об относительно стабильном состоянии популяций и широком распространении. Амплитуда динамики количественных показателей значительна, что требует внесения в перечень особого внимания.

6. Обыкновенный гоголь – *Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758). Обычный пролетный вид, однако существуют указания на отдельные случаи гнездования в регионе. В гнездовой период нуждается в особом внимании.

7. Луток – *Mergus albellus* Linnaeus, 1758. Отмечено гнездование на значительном удалении от основного ареала.

Отряд Соколообразные – Falconiformes

8. Черный коршун – *Milvus migrans* (Boddaert, 1783). Отмечены случаи снижения репродуктивных показателей в связи с накоплением в организме промышленных поллютантов. Учитывая тесную связь вида с антропогенными местообитаниями, необходимо внести его в список особого внимания.

9. Полевой лунь – *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766). Вид в регионе обитает на границе репродуктивного ареала. Численность стабильна, но невысока, что обуславливает необходимость внесения вида в список особого внимания.

10. Луговой лунь – *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758). В пределах области часто становится объектом трофейной охоты, что обуславливает необходимость внесения вида в список особого внимания.

11. Болотный лунь – *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758). Вид разрешен к отстрелу в охотничьих угодьях без ограничений, что может отрицательно сказываться на динамике численности.

12. Тетеревятник – *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758). Малочисленный, локально распространенный вид, экологически связан с участками высокоствольного

леса. Численность не демонстрирует значительных колебаний, но повсеместно низка, что требует внесение вида в список особого внимания.

13. Перепелятник – *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758). Внесен в приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), а также приложение А Правил регулирования торговли, принятых странами Европейского сообщества.

14. Зимняк – *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763). Внесен в приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), а также приложение А Правил регулирования торговли, принятых странами Европейского сообщества.

15. Обыкновенный канюк – *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758). Численность вида находится в тесной зависимости от обилия кормовых объектов и может испытывать значительные колебания, что обуславливает необходимость внесения вида в список особого внимания.

16. Чеглок – *Falco subbuteo* Linnaeus, 1758. Внесен в приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), а также приложение А Правил регулирования торговли, принятых странами Европейского сообщества.

17. Дербник – *Falco columbarius* Linnaeus, 1758. Редкий зимний мигрант с невысокой численностью. На юге области возможны встречи птиц южного подвида, особенности динамики численности которого слабо изучены, что требует внесения вида в перечень особого внимания.

18. Кобчик – *Falco vespertinus* Linnaeus, 1766. Внесен в приложение 2 к приказу Госкомэкологии РФ № 290 от 12.05.1998 г. как вид, нуждающийся в особом внимании. Учитывая восприимчивость вида к применению инсектицидов, необходимо включить его в список особого внимания.

19. Обыкновенная пустельга – *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758. Внесен в приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), а также приложение А Правил регулирования торговли, принятых странами Европейского сообщества.

Отряд Курообразные – Galliformes

20. Перепел – *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758). Внесен в приложение 2 к приказу Госкомэкологии РФ № 290 от 12.05.1998 г. как вид, нуждающийся в особом внимании.

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

21. Пастушок – *Rallus aquaticus* Linnaeus, 1758. Выводится из списков региональной Красной книги на основе современных данных об относительно стабильном состоянии популяций и широком распространении. Амплитуда динамики количественных показателей значительна, что требует внесения в перечень особого внимания.

22. Коростель – *Crex crex* (Linnaeus, 1758). Внесен в приложение 2 к приказу Госкомэкологии РФ № 290 от 12.05.1998 г. как вид, нуждающийся в особом внимании.

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

23. Клуша – *Larus fuscus* Linnaeus, 1758. Внесен в приложение 2 к приказу

РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПТИЦЫ

Госкомэкологии РФ № 290 от 12.05.1998 г. как вид, нуждающийся в особом внимании.

24. Чайконосная крачка – *Gelochelidon nilotica* (Gmelin, 1789). Внесен в приложение 2 к приказу Госкомэкологии РФ № 290 от 12.05.1998 г. как вид, нуждающийся в особом внимании.

Отряд Голубеобразные – Columbiformes

25. Обыкновенная горлица – *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758). Значительные межгодовые колебания численности и прогрессирующее разрушение местообитаний обуславливает включение вида в список особого внимания.

Отряд СOVOобразные – Strigiformes

26. Ушастая сова – *Asio otus* (Linnaeus, 1758). Численность вида находится в тесной связи с численностью кормовых объектов и испытывает значительные циклические колебания.

27. Болотная сова – *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763). Связь вида с ненарушенными и слабонарушенными луговыми и степными местообитаниями определяет его потенциальную уязвимость.

28. Сплюшка – *Otus scops* (Linnaeus, 1758). В настоящее время вид демонстрирует негативные тенденции численности и распространения, особенно в Правобережье, что обуславливает необходимость внесения его в список особого внимания.

29. Домовый сыч – *Athene noctua* (Scopoli, 1769). Внесен в приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), а также приложение А Правил регулирования торговли, принятых странами Европейского сообщества.

30. Серая неясыть – *Strix aluco* Linnaeus, 1758. Вид тесно связан с лесами любых типов. Уязвимость популяций на границе распространения леса является причиной внесения вида в перечень особого внимания.

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

31. Обыкновенный жулан – *Lanius collurio* Linnaeus, 1758. Наблюдается долговременная тенденция снижения численности вида, что обуславливает его включение в список особого внимания.

32. Обыкновенный скворец – *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758. Наблюдается прогрессирующее снижение численности на всем протяжении ареала за пределами региона, что обуславливает его включение в список особого внимания.

33. Широкохвостая камышевка – *Cettia cetti* (Temminck, 1820). Известно нерегулярное размножение вида у северного предела распространения. Уязвимость пограничных популяций является причиной включения вида в список особого внимания.

34. Обыкновенный сверчок – *Locustella naevia* (Boddaert, 1783). Выводится из списков региональной Красной книги на основе современных данных об относительно стабильном состоянии популяций и широком распространении. Амплитуда динамики количественных показателей значительна, что требует внесения в перечень особого внимания.

35. Тонкоклювая камышевка – *Luscinola melanopogon* (Temminck, 1823). Динамика численности вида в регионе изучена недостаточно, в сопредельных областях характеризуется как редкий охраняемый вид.

36. Черноголовая гаичка – *Parus palustris* Linnaeus, 1758. Выводится из списков региональной Красной книги на основе современных данных об относительно стабильном состоянии популяций и широком распространении на границе ареала. Амплитуда динамики количественных показателей значительна, что требует внесения в перечень особого внимания.

37. Горная чечетка – *Acanthis flavirostris* (Linnaeus, 1758) Существуют указания на возможность спорадического размножения на юге Саратовской области.

Особо следует заметить, что аннотированные перечни, в отличие от основного раздела региональной Красной книги, не являются правовым документом и их цель – привлечь внимание природоохранной и научной общественности к состоянию популяций перечисленных в них видов животных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Девяшев Р.А. Состав, численность, воспроизводство водоплавающих птиц Саратовской области // Тр. комплексной экспедиции Саратовского университета по изучению Волгоградского и Саратовского водохранилищ. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1975. Вып. 4. С. 113 – 123.

Завьялов Е.В., Табачишин В.Г. Теоретическое обоснование внесения в Красную книгу России популяций европейского среднего дятла из бассейнов Волги и Дона // Редкие, исчезающие и малоизученные птицы России / Союз охраны птиц России. М., 2000. С. 170 – 174.

Красная книга Российской Федерации. Животные. М.: Астрель, 2001. 908 с.

Красная книга Саратовской области: Растения, грибы, лишайники. Животные. Саратов: Регион. Приволж. кн. изд-во «Детская книга», 1996. 264 с.

Морозов В.В. Результаты работ по проекту Союза охраны птиц России «Поиск мест гнездования тонкоклювого кроншнепа» в 1997 году // Информационные материалы Рабочей группы по куликам. М.: Изд-во «Диалог-МГУ», 1998. № 11. С. 14 – 15.

Мосейкин В.Н. Вероятная находка тонкоклювого кроншнепа в саратовском Заволжье // Информационные материалы Рабочей группы по куликам. Екатеринбург, 1992. С. 44 – 45.

Мосейкин В.Н. Новые орнитологические находки в Саратовской области // Рус. орнитол. журн. 2000. Экспресс-вып. № 104. С. 3 – 7.

Пискунов В.В., Антончиков А.Н., Беляченко А.В. Современное состояние и тенденции изменений орнитофауны северной части Нижнего Поволжья // Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии: Материалы Междунар. конф. (XI Орнитол. конф.). Казань: Изд-во «Матбугат йорты», 2001. С. 490 – 491.

Флинт В.Е. Стратегия сохранения редких видов в России: теория и практика. М.: ГЕОС, 2004. 376 с.

Флинт В.Е., Присяжнюк В.Е. Совершенствование методологических основ и методических приемов ведения Красных книг (раздел «Позвоночные животные») // Изучение редких животных в РСФСР: Материалы к Красной книге / ЦНИЛ Главохоты РСФСР. М., 1991. С. 51 – 66.

Шляхтин Г.В., Завьялов Е.В. Стратегия сохранения редких видов млекопитающих Саратовской области // Редкие виды млекопитающих России и сопредельных территорий: Тез. докл. Междунар. совещ. М., 1997. С. 101.